

ARB 桜ヶ丘院内フォーミュラー

		第一選択	第二選択
医学的区分	高血圧	テルミサルタン錠 オルメサルタン錠 カンデサルタン錠	アジルサルタン錠(他のARBで効果不十分時) ロサルタン錠(腎保護優先時)

高血圧治療ガイドライン 2019、糖尿病診療ガイドライン 2019 年、エビデンスに基づく CKD 診療ガイドライン 2018 年、大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン 2020 年、急性・慢性心不全診療ガイドライン 2017 年で、特定 ARB を推奨する記載・使い分けは無い・以上 降圧効果を筆頭に点を考慮し上記フォーミュラーを作成した・ロサルタンは他の ARB と比較して降圧効果が弱いことを示唆する報告があるが腎保護目的への使用を考慮し第一選択とした。*高齢化を考慮し OD 錠も 2 剤記載した。 2023年6月発行

ARB 概要

採用薬名	オルメサルタン OD 錠「トーワ」	テルミサルタン錠「トーワ」		ロサルタン K 錠「DK」	アジルサルタン OD 錠「サワイ」	イルベサルタン OD 錠「トーワ」	カンデサルタン OD 錠「サワイ」	バルサルタン OD 錠「トーワ」	
一般名	オルメサルタン	テルミサルタン		ロサルタン	アジルサルタン	イルベサルタン	カンデサルタン	バルサルタン	
採用区分	院内・院外	院内・院外		院内・院外	院内・院外	院外	院内・院外	院外	
採用規格 薬価(1錠)*1	20mg 29.8 円	20mg 10.1 円	40mg 12.7 円	25mg 14.9 円	20mg 円	100mg 32.2 円	4mg 24.2 円	40mg 23.5 円	80mg 30.4 円
用法	1日1回	1日1回		1日1回	1日1回	1日1回	1日1回	1日1回	
成人高血圧症の用量	1日 5-10mg から開始、1日 10-20mg 適宜増減 MAX 1日 40mg	1日 20mg から開始 1日 40mg 適宜増減 MAX 1日 80mg		1日 25-50mg 適宜増減 MAX 1日 100mg	1日 20mg 適宜減 Max 1日 40mg	50-100mg 1日1回 MAX 1日 200mg	4-8mg 1日1回適宜増減 MAX 12mg 腎機能低下の場合 2mg 1日1回から開始 MAX 1日 8mg	40-80mg 1日1回適宜増減 MAX 1日 160mg	
経管投与	可	可(要粉砕)		可(要粉砕)	可	可	可(要粉砕)	可	
用量規定因子	—	肝障害患者の場合、MAX 1日 1回 40mg 胆汁分泌が極めて悪い又は重篤な肝障害のある患者		重篤な肝障害患者	—	—	—	—	
腎機能による調整*2	減量不要だが、低腎機能の場合は少量から開始								

*1:2023 年 6 月時点 *2腎機能別薬剤投与量 第 3 版 じほうより