

PPI/P-CAB 清水さくら病院院内フォーミュラリー

		第一選択	第二選択
医学的区分	消化性潰瘍	ランソプラゾール OD 錠 ラベプラゾール錠	エソメプラゾールカプセル
	逆流性食道炎 ※2		

※1参考ガイドライン:①GERD 診療ガイドライン2021②消化性潰瘍診療ガイドライン2020(改訂第3版)③HP 感染の診断と治療ガイドライン2024改訂版④胃癌に対するESD・EMRガイドライン第2版 ※2①低用量アスピリン潰瘍②非H/P③非NSAIDS潰瘍④ハイリスク群(潰瘍既往あり、抗血小板2剤併用、NSAIDS潰瘍)を含む。 2023年7月発行 2025年8月改訂

条件付き使用選択薬

タケキャブ錠

(ボノプラザン)

条件:重症逆流性食道炎

H・ピロリ一次除菌 ※3

※3専門医・消化器内科の処方推奨

【詳細】

◎第一選択薬について

★ランソプラゾール:「PPIによる治療効果不十分な時の逆流性食道炎」を除き適応症が広い。経済性に優れる。唯一のOD錠であり高齢者、嚥下困難患者にも投与が可能

★ラベプラゾール:「PPIによる治療効果不十分な時の逆流性食道炎」の適応が唯一ある製品であるとともに、広い適応症を有し、相互作用も比較的少なく経済性に優れる

*長期投薬による下痢:膠原線維性大腸炎(collagenous colitis)の発症リスクはランソプラゾールが高いことも考慮

◎第二選択薬について

★エソメプラゾール:承認用量が20mg/日までであり、他剤の最大用量に対する優越性が十分に検証されておらず、第一選択薬で代替可能である。唯一小児の適応がある。

◎条件付き使用選択薬について

★タケキャブ(ボノプラザン):「H・ピロリの一次除菌」「逆流性食道炎再発難治例」等や、重症例といった必要患者は想定されるが、薬剤費が高価なうえ、ガストリン値上昇に関する潜在的なリスクあり。海外販売が少なくエビデンスが現時点で他剤より少ない

PPI/P-CAB 清水さくら病院院内フォーミュラリー

		ランソプラゾール		ラベプラゾール	エソメプラゾール		タケキャブ(先発)	
剤形・量		OD 錠 15 mg 「トーフ」	OD 錠30mg 「トーフ」	錠 10 mg「ケミファ」	カプセル 10 mg 「NP」	カプセル20mg 「NP」	OD 錠 10 mg	OD 錠 20 mg
薬価 (円/錠)		12.4	20.8	20.3	24.0	41.8	96.8	144.8
胃潰瘍 (GU)		1 日 1 回 30mg 8 週間まで		1 日 1 回 10mg (最大 20mg) 8 週まで	1 日 1 回 20mg 8 週まで		1 日 1 回 20mg 8 週まで	
十二指腸潰瘍 (DU)		1 日 1 回 30mg 6 週間まで		1 日 1 回 10mg (最大 20mg) 6 週まで	1 日 1 回 20mg 6 週まで		1 日 1 回 20mg 6 週まで	
逆流性食道炎	治療	1 日 1 回 30mg 8 週間まで		1 日 1 回 10mg(最大 20mg) 8 週間まで (効果不十分:1 回 10~20mg 1 日 2 回さらに 8 週間まで)	1 日 1 回 20mg 8 週まで		1 日 1 回 20mg 4 週まで(最大 8 週)	
	維持	1 日 1 回 15mg (効果不十分 30mg)		1 日 1 回 10mg (効果不十分:1 回 10mg 1 日 2 回)	1 日 1 回 10mg (最大 20mg)		1 日 1 回 10mg (効果不十分:1 日 1 回 20mg)	
低用量アスピリン投与時の GU,DU の再発抑制		1 日 1 回 15mg		1 日 1 回 5mg (最大 10mg)	1 日 1 回 20mg		1 日 1 回 10mg	
NSAIDs 投与時の GU,DU の再発抑制		1 日 1 回 15mg		—	1 日 1 回 20mg		1 日 1 回 10mg	
H.pylori の除菌補助		1 日 2 回 1 回 30mg 7 日間		1 日 2 回 1 回 10mg 7 日間	1 日 2 回 1 回 20mg 7 日間		1 日 2 回 1 回 20mg 7 日間	
吻合部潰瘍		1 日 1 回 30mg 8 週間まで		1 日 1 回 10mg (最大 20mg) 8 週まで	1 日 1 回 20mg 8 週間まで		—	
Zollinger-Ellison 症候群		1 日 1 回 30mg		1 日 1 回 10mg (最大 20mg)	1 日 1 回 20mg		—	
非びらん性胃食道逆流症		1 日 1 回 15mg 4 週間まで		1 日 1 回 10mg 4 週間まで	1 日 1 回 10mg 4 週間まで		—	
経管投与		○		×	△(閉塞リスク有り)		○	
PPI 代謝経路		CYP3A4+2C19		非酵素的還元反応	CYP3A4+2C19		CYP3A4	