

チアジド系利尿剤(類似薬含) 清水さくら病院院内フォーミュラリー ※1

		第一選択薬	第二選択薬
医学的区分	高血圧症	トリクロルメチアジド錠 (先発名:フルイトラン錠)	ナトリックス錠 (一般名:インダパミド錠)

※1参考ガイドライン:①高血圧症治療ガイドライン2019②急性・慢性心不全診療ガイドライン2017年改訂版等 ※2第一選択薬とは薬効群中において臨床上必要度が高い医薬品、第二選択薬とは第一選択薬で代替可能ではあるが当院における使用実績等を参考に使用する医薬品
2024年11月発行 2025年11月改訂

チアジド系利尿剤(類似薬含) 概要

採用薬名	トリクロルメチアジド錠2mg 「トーフ」(後発)	ナトリックス錠1mg (先発)	【第一選択薬について】 適応範囲が広く、様々な病態の浮腫・高血圧へ投与が可能。ガイドライン上でも広く推奨されており併用療法についてのエビデンスも豊富。 適応:心性・腎性・肝性浮腫、本態性・腎性・悪性等各種高血圧、月経前緊張症
採用区分	院内・院外	院内・院外	【第二選択薬について】 ガイドライン上での推奨があり、エビデンスが豊富。適応が <u>本態性高血圧のみ</u> 、後発品が存在しないため第二選択とした。
採用規格 薬価(1錠)	6.4円/錠	10.4円/錠	
用法	1日1~2回投与	1日1回投与	
副作用	低Na血症、低K血症、高尿酸血症、高脂血症、耐糖能低下		
その他	★ガイドライン推奨:心不全の発症予防効果が高い。 ★併用療法の推奨 ①ACE,またはARB+チアジド②Ca拮抗剤+チアジド		